



Selontra Einsatz beim Verein Stadtgeiss

4.11.2022

Marcus Schmidt

Schädlingsprävention Stadt Zürich



Inhalt

- Selontra
- Wirkungsweise
- Anwendung
- Rattenbekämpfung
- Gelände, Köderstandorte
- Vorköderung
- Beköderung mit Selontra

Selontra Wirkung


EINZIGARTIGER
WIRKMECHANISMUS
DURCH CHOLECALCIFEROL



HOHE
ATTRAKTIVITÄT



VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE
BEREITS IN 7 TAGEN MÖGLICH



**3 x schnellere Befallskontrolle
als mit antikoagulanten
Rodentiziden möglich**

**Steigerung des Kalzium-
spiegels im Blut**




**Stop-Feeding-Effekt
24h nach Aufnahme
der letalen Dosis**



**Verenden durch
Hyperkalzämie**

Tägliche Nahrungsaufnahme und LD50 von Selontra

TÄGLICHE NAHRUNGS-AUFNAHME VON:



Die letale Dosis (LD50) Selontra® wird von Ratten und Mäusen in der Regel innerhalb von 24 Stunden aufgenommen

Vorgehen mit Selontra

DOMINANZ-HIERARCHIE BEIM BEFALL

Dominante Tiere:
Fressen in Phase 1




Subdominante
Tiere: Fressen
in Phase 2



Nicht dominante
Tiere: Fressen
in Phase 3



Tage der
Köder-
auslage



Vollständige Kontrolle des Befalls ist möglich in **7 TAGEN**

1

Erst-
auslage

2

Köder
nachlegen

3

4

5

6

7

Entsorgung oder
Köder nachlegen

Umwelteinflüsse von Cholecalciferol



Geländeübersicht




Rattenproblem erst nach Installation Hühnerstall




Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz

Selontra Einsatz beim Verein Stadtgeiss
Marcus Schmidt



09.11.2022
Seite 8

Ratteninspektion: Gelände und Platzierung der Köder



Beköderung mit Non-Tox Ködern



Beköderung mit Selontra



Beköderung mit Selontra



Beköderung mit Selontra




1. Kontrolle Selontra




Endkontrolle



Zeitachse der Aktionen



Ratteninspektion: Gelände und Platzierung der Köder



Fragen?

