Popillia japonica

(POPIJA)

Scarabée japonais

Caractéristiques



Hanneton

Hanneton de juin

Hanneton des jardins

Cycle de vie



Aus Präsentation Japankäfer Agroscope, Grabenweger und Weibel, www.zh.ch

Les vers blanc se trouvent dans les prairies et les pelouses

Diffusion



© EPPO https://gd.eppo.int; verändert von Lara Wyser, Agroscope/ ETH-Z



Lutte - Chimique

- période de vol ~2 mois = plusieurs fois
- Prévention de la ponte des œufs
- A Kloten avec l'acétamipride - néonicotinoïde, effet systémique

Foto: Leano Andali, Birchmeier Sprühtechnik AG

Lutte - Alternatives

- Adultes volants

  Pièges à attractifs avec insecticide

  filets anti-insectes à longue durée de vie (LLINs)

Prototyp gegen Japankäfer, © F. Paoli, CREA, Florenz, IT

Foto: Christian Wüthrich, www.zuonline.ch, 03.08.2023

Lutte - Alternatives

- Champignons entomopathogènes «attract and infest»



Aus Präsentation Japankäfer Agroscope, Grabenweger und Weibel, www.zh.ch

Lutte - Alternatives

- Contre les larves dans les prairies et les pelouses
  Maintenir sec
  Nématodes, genre Heterorhabditis



Heterorhabditis nematodes, © A. Peters, e-nema, Kiel, DE

Obligation de notification et de lutte

- Si vous trouvez un et que vous êtes sûr qu'il s'agit d'un coléoptère du Japon, capturez-le, mettez-le dans un bocal bien fermé ou dans une boîte alimentaire et placez le récipient au congélateur pendant la nuit. Faites-le même si le coléoptère semble déjà mort. Ce n'est qu'ensuite que vous devez jeter le coléoptère mort avec les ordures ménagères.

- Envoyez en outre une photo de l'insecte avec des indications sur le lieu de découverte au service phytosanitaire cantonal concerné.

Japankäfer an Rebe.
Foto: zh.ch